


# Benzbromaron

Desuric®



# Inhoudsopgave

- 3 Hoe werkt benzbromaron?
- 3 Voor welke aandoeningen gebruik je benzbromaron?
- 3 Hoe moet ik het gebruiken?
- 3 Hoe bewaar ik benzbromaron?
- 3 Welke bijwerkingen kan ik krijgen?
- 4 Zijn er controles nodig als ik benzbromaron gebruik?
- 4 Kan ik benzbromaron gebruiken met andere medicijnen?
- 4 Wat moet ik nog meer weten?
- 5 Meer informatie of vragen?

## **Disclaimer**

Aan deze folder kun je geen rechten ontlennen. Controleer het altijd met de tekst in de bijsluiter die je bij je medicijn hebt gekregen. Neem bij vragen of onduidelijkheden over het medicijn contact op met je behandelend arts.

## Hoe werkt benzbromaron?

Benzbromaron is een medicijn dat je krijgt voorgeschreven van je arts als je jicht hebt. Jicht is een reumatische aandoening die ontstaat doordat er urinezuurkristallen in je gewrichten 'neerslaan'. Dit gebeurt als je teveel urinezuur in je bloed hebt.

Deze 'neerslag' in de gewrichten kan leiden tot plotselinge aanvallen van gewrichtsontstekingen. Als urinezuur ook in de huid of pezen neerslaat ontstaan er soms zogenaamde jichtknobbels (jichttophi).

Als je benzbromaron gaat gebruiken, zal in de loop van enkele weken tot maanden de hoeveelheid urinezuur in het bloed minder worden. Dit medicijn zorgt ervoor dat je het urinezuur beter via je urine kwijt kunt. Wanneer de concentratie urinezuur in het bloed laag genoeg is (meestal onder de 0,35 mmol/l), lost het urinezuur, dat in de gewrichten was neergeslagen, op. Op die manier voorkom je nieuwe jichtaanvallen. Ook kunnen de jichtknobbels verdwijnen. Het kan maanden duren voordat de neergeslagen urinezuurkristallen helemaal opgelost zijn.

Een jichtaanval kan tijdelijk erger worden wanneer je tijdens zo'n aanval met benzbromaron begint. Het medicijn werkt niet tegen acute jichtaanvallen.

Om aanvallen tijdens behandeling met benzbromaron te voorkomen krijg je daarom tijdens de eerste maanden dat je benzbromaron gebruikt ook een medicijn voorgeschreven dat de acute gewrichtsontstekingen tegengaat. Meestal is dat colchicine. Stop colchicine alleen in overleg met je behandelaar.

## Voor welke aandoeningen gebruik je benzbromaron?

Je arts schrijft benzbromaron voor als je de diagnose 'jicht' hebt gekregen en als:

1. je meer dan 2 x per jaar last hebt van een jichtaanval
2. je jichtknobbels hebt

3. je gewrichten door de eerdere jichtaanvallen beschadigd zijn geraakt

Benzbromaron gebruik je om jichtaanvallen te voorkomen en om jichtknobbels te laten verdwijnen. Je krijg dit middel meestal als je het voorkeursmiddel (allopurinol) niet kan of mag gebruiken. Soms krijg je benzbromaron in combinatie met allopurinol.

## Hoe moet ik het gebruiken?

Benzbromaron krijg je in de vorm van tabletten van 100 mg. Vaak begin je met een lage dosis en wordt de dosis langzaam verhoogd tot het urinezuur in je bloed voldoende is gedaald. Je arts bespreekt met jou welke dosis je gaat gebruiken. De maximale dosering is 300 mg per dag.

## Hoe bewaar ik benzbromaron?

De benzbromaron tabletten bewaar je in de originele verpakking op een droge plaats bij een huiskamertemperatuur die onder de 30°C ligt.

## Welke bijwerkingen kan ik krijgen?

De apotheker geeft je altijd een bijsluiter mee. Lees deze bijsluiter goed. Je leest in de bijsluiter een uitgebreid overzicht van alle bijwerkingen die kunnen voorkomen, van zeer vaak tot zeer zelden. Het is mogelijk dat je een bijwerking krijgt, maar dat hoeft niet.

Hieronder lees je welke belangrijke bijwerkingen kunnen voorkomen bij benzbromaron gebruikers:

- Maag- en darmklachten (zoals diarree en misselijkheid)
- Hoofdpijn
- Nierstenen. Benzbromaron kan nierstenen veroorzaken vooral als je eerder nierstenen hebt gehad. Soms zal je reumatoloog voor het starten

met benzbromaron een urineonderzoek laten doen om te bekijken of je een verhoogde kans op nierstenen hebt.

- Bijwerkingen van organen: bijwerkingen die je zelf niet merkt maar je arts via bloedonderzoek wel in de gaten houdt, zoals leverfunctietests. Een leverbeschadiging komt in zeldzame gevallen voor bij gebruik van benzbromaron
- Allergische reacties: wanneer je overgevoelig bent voor benzbromaron kun je een allergische reactie krijgen. Denk aan (nieuwe) huidafwijkingen, koorts of benauwdheid. Neem dan zo snel mogelijk contact op met je huisarts, reumaverpleegkundige en/of behandelaar.

## Zijn er controles nodig als ik benzbromaron gebruik?

Je arts zal regelmatig een bloedtest doen om te controleren of het urinezuur voldoende is gedaald en de benzbromaron dus goed werkt. Ook controleert je arts je bloed tijdens de behandeling op bijwerkingen die in het bloed zichtbaar zijn. Dit zal in het begin vaker zijn dan wanneer je het medicijn al langer gebruikt.

## Kan ik benzbromaron gebruiken met andere medicijnen?

Benzbromaron gebruik je doorgaans veilig naast de meeste andere geneesmiddelen. Er zijn een paar uitzonderingen, vertel het dus altijd aan je arts en je apotheker welke medicijnen je gebruikt of als er iets aan je medicijngebruik verandert.

Benzbromaron mag je niet samen gebruiken met het medicijn pyrazinamide. Dat is een middel voor de behandeling van tuberculose.

Benzbromaron kan de werking van bloedverdunders versterken; als je bloedverdunders gebruikt, licht dan altijd de trombosedienst in bij het starten of wijzigen van de dosering benzbromaron.

## Wat moet ik nog meer weten?

**Alcohol** Er is geen bezwaar als je (matig) alcohol gebruikt tijdens de behandeling met benzbromaron. Je doet er goed aan om alcoholische dranken die veel urinezuur bevatten, zoals bijvoorbeeld bier, te vermijden. Die kunnen namelijk een jichtaanval uitlokken.

**Autorijden** Er is geen bezwaar tegen autorijden, fietsen, besturen van een scootmobiel of machine tijdens gebruik van benzbromaron.

**Operaties en andere (tandheelkundige) ingrepen** Ga je naar de tandarts voor een ingreep of word je geopereerd? Geef dan aan dat je benzbromaron gebruikt zodat de (tand)arts zo nodig maatregelen kan nemen.

**Reizen** Overleg met je arts of en hoe je mag reizen. Bij reizen naar het buitenland is het raadzaam een actueel overzicht van je medicijnen mee te nemen, het medicijnpaspoort. Daarin staat dat je benzbromaron gebruikt. Dit paspoort kun je krijgen bij je apotheek of eventueel bij je behandelaar.

**Vaccinaties** Je kunt je zonder problemen laten vaccineren tijdens het gebruik van benzbromaron.

**Vruchtbaarheid, zwangerschap en borstvoeding** Heb je een kinderwens of ben je (onverwacht) zwanger, vertel dit dan aan je arts. Je arts zal dan samen met jou beslissen wat je het beste aan je medicijngebruik kan veranderen als dat nodig is.

Van benzbromaron is niet bekend of het de vruchtbaarheid beïnvloedt.

Omdat er weinig informatie bestaat over de effecten van benzbromaron tijdens zwangerschap mag je het niet tijdens de zwangerschap gebruiken

Benzbromaron komt in de moedermelk terecht. Het is daarom beter geen benzbromaron te gebruiken tijdens het geven van borstvoeding.

## Meer informatie of vragen?

Als je nog vragen hebt, stel ze dan gerust aan je reumatoloog, reumaverpleegkundige of apotheker.


# Colofon

De teksten in deze medicatiefolder zijn tot stand gekomen in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Reumatologie (NVR), reumatologie netwerk Zuid-Oost Nederland en ReumaNederland.

## ReumaNederland

Postbus 59091  
1040 KB Amsterdam

t 020 589 64 64

info@reumanederland.nl  
www.reumanederland.nl  
 Facebook.com/reumanederland

november 2020

## Copyright

Informatie uit deze folder hergebruiken/delen is toegestaan mits de bron (ReumaNederland) wordt genoemd.